



## KATALOG POGODNOSTI

Svake sedmice, za Vas smo pripremili po pet proizvoda sa sniženim cijenama od 10 do 30%. Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici Apoteke B Pharm, kao i na Instagram profilu apoteke\_b\_pharm.

UŽIVAJTE U POGODNOSTIMA!

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

MART	
DATUM	PROIZVOD, PROIZVOĐAČ
01-08.03.	Omega 3 maxi cps a100, Belupo
	Grippostad cps a10, Hemofarm
	Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab
	Merz special drag a60, Merz
	Dr. Muller sorto, Dr Muller
09-15.03.	Omega 3 maxi cps a100, Belupo
	Hepafar fibers a15, Sensilab
	Magnetrans granule 375mg, Hemofarm
	Lekadol C granule, Lek
	DH Vitamini A-Z, Doppelherz
16-22.03.	DH Eye vital, Doppelherz
	Sens Slimjoy Bootburn Strong a15, Sensilab
	Grippostad cps a20, Hemofarm
	Sens Urifar a14, Sensilab
	Sens Osteo cps a20, Sensilab
23-31.03.	Sens Imunostrong a3, Sensilab
	Lekadol C granule, Lek
	Sens Slimjoy Waterout strong a10, Sensilab
	Sens Mg 375 mg, Sensilab
	Dr. Muller sorto, Dr Muller

APRIL	
DATUM	PROIZVOD, PROIZVOĐAČ
01-12.04.	Acipan stop 14x20mg, Lek
	Flonidan tbl 10X10mg, Lek
	Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm
	Sens Symbiotic cps a10, Sensilab
	Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab
13-19.04.	Sens Imunostrong a3, Sensilab
	Lekadol tbl 18x500mg, Lek
	Grippostad cps a 20, Hemofarm
	Sens Omega cps a60, Sensilab
	Sens Urifar a14, Sensilab
20-30.04.	DH Vitamini i minerali, Doppelherz
	Sens Osteo cps a20, Sensilab
	Magnetrans granule 375mg, Hemofarm
	Flonidan tbl 10X10mg, Lek
	Linex cps a16, Lek

## REFERENTNE VRIJEDNOSTI

Holesterol u krvi		
GODINE	MUŠKO	ŽENSKO
14 – 19 god.	3.87 – 5.55	3.87 – 5.42
20 – 44 god.	3.35 – 5.95	4.00 – 6.20
45 – 59 god.	3.48 – 6.45	4.00 – 6.58
> 60 god.	3.61 – 6.86	3.61 – 6.86

Trigliceridi u krvi	
POL	VRIJEDNOSTI
MUŠKO	0.5 - 2.0 mmol/L
ŽENSKO	0.4 - 1.6 mmol/L

Glukoza u krvi	
● 4.5 - 7 mmol/L natašte	
● < 11 mmol/L 2h poslije jela	

**NAPOMENA:** Ove vrijednosti su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u dijagnostičke svrhe.

# USLUGE MJERENJA U APOTEKAMA B PHARM



IZVORI: <http://www.who.int/features/qa/82/en/>  
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/>  
[http://www.who.int/cardiovascular\\_diseases/priorities/en/](http://www.who.int/cardiovascular_diseases/priorities/en/)



## OTVORILI SMO JOŠ JEDNU B PHARM APOTEKU!

**A**poteke B Pharm su proširile svoju mrežu. U januaru smo otvorili još jednu novu apoteku B Pharm br. 73, u Banjaluci. Nova apoteka je moderno uređena sa širokim asortimanom proizvoda. U njoj lijekove možete podizati sa ili bez recepta. Organizovali smo i besplatna mjerenja gustine kostiju, određivanje starosti krvnih sudova, lipidnog statusa, kao i određivanje vitaminsko-mineralnog statusa.

Naše stručno osoblje je tu da vam uvijek bude na usluzi, da vam pruži potrebne informacije i da vam da najbolju preporuku preparata.

Apoteka se nalazi na adresi Milana Tepića 23, u blizini Poliklinike. Radno vrijeme apoteke je: radnim danom od 07:30 do 22:00, subotom od 08:00 do 20:00 i nedjeljom od 08:00 do 14:00h.

Očekujemo vas!

### RIJEČ FARMACEUTA

## GOJAZNOST I ŠEĆERNA BOLEST

**D**ijabetes melitus tip 2 predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih problema širom svijeta. Incidenca ovog oboljenja povećava se sa godinama i veća je kod osoba ženskog pola nego kod muškog.

Osobe oboljele od ove bolesti imaju povećan rizik za nastanak i razvoj komplikacija koje dovode do prijevremene nesposobnosti i smrti.

Dijabetes tip 2 spada u grupu hroničnih oboljenja i kod njega simptomi mogu biti u početku slabije izraženi, tako da osobe godinama žive ignorišući simptome i obično se jave doktoru kada je bolest već ostavila traga.

Smanjena tolerancija na glukozu može postojati i desetak godina prije postavljanja dijagnoze. Jedan od vodećih faktora rizika i otežavajućih faktora u liječenju dijabetesa tipa 2 jeste gojaznost.

Šećerna bolest i gojaznost su dvije pandemije modernog doba koje se žargonski mogu povezati jednim imenom „diabesity“. Svi oboljeli od šećerne bolesti nisu gojazni, niti svi gojazni imaju šećernu bolest, ipak je više od 80 % odraslih dijabetičara gojazno.

Prevalenca šećerne bolesti kod gojaznih osoba ubrzano raste, posebno kod osoba sa centralnim tipom gojaznosti, a takve osobe je lako na prvi pogled prepoznati jer imaju oblik tijela kao jabuka.

Danas se prisustvo centralne (visceralne) gojaznosti smatra glavnim uzročnikom povećane koncentracije cirkulišućih inflamatornih hormona, nazvanih adipokini.

Masno tkivo se ranije smatralo metabolički neaktivnim i energetskim zalihama organizma, ali danas je poznato da masno tkivo ima i endokrinu funkciju i da putem svojih posrednika komunicira sa centralnim nervnim sistemom i perifernim tkivima.

Visceralno masno tkivo i njegova povećana aktivnost povezuje se sa insulinskom rezistencijom, poremećajem nivoa masnoća u krvi, povišenim pritiskom što sve zajedno dovodi do povećanog kardiovaskularnog rizika.

Kod osoba kod kojih postoji genetska predispozicija i gojaznost postoji mogućnost razvoja insulinske rezistencije. Tkiva postaju sve manje osjetljiva na insulin, a pojačano lučenje insulina od strane beta ćelija pankreasa dodatno ih iscrpljuje.

Porastom tjelesne težine svakih 10 kg povećava se 10-30% masa beta ćelija kao kompenzatorni odgovor na insulinsku rezistenciju. Tako da smanjenje tjelesne težine ima povoljan uticaj na nivo šećera u krvi i smanjenje komplikacija koje visok nivo nosi.

Gojaznost je definisana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao BMI > 30 kg/m<sup>2</sup>. Kod pacijenata sa povećanim rizikom, kao što je slučaj kod oboljelih od šećerne bolesti preporučuje se BMI manji od 27 kg/m<sup>2</sup>. Pod etnički specifičnim kriterijumima za centralnu gojaznost za osobe iz Evrope smatra se da je obim struka kod muškaraca jednak ili veći od 94 cm i kod žena obim struka jednak ili veći 80 cm, dok su Američki kriterijumi nešto blaži i odnose se za muškarce 102 cm, a za žene 88 cm.

Definicija centralne gojaznosti data je od strane SZO i kao odnos obima struka i kukova (>0,9 za muškarce i >0,85 za žene). Kod žena oboljelih od šećerne bolesti hormonske promjene koje su nastale u menopauzi dodatno ometaju dobru regulaciju nivoa šećera u krvi.

Ukoliko se nalazite u kategoriji koja obuhvata povećan obim struka i BMI vrijeme je da preduzmete odgovornost za svoje zdravlje, razmotrite prekid pušenja, posvetite vrijeme kvalitetnoj fizičkoj aktivnosti i pravilnoj ishrani koja vodi gubitku tjelesne mase i uz odgovarajuću terapiju što bolje regulišete nivo šećera u krvi i time spriječite eventualne komplikacije koje nosi ovo oboljenje.

### Da li ste znali?

*Magistri farmacije koji su zaposleni u apotekama „B Pharm“ su prepoznali potrebu za ovim vidom edukacije stanovništva i omogućili kvalitetne savijete u vezi ishrane, terapije i fizičke aktivnosti i na taj način omogućili široj populaciji da svakodnevno razjasne svoje nedoumice.*

U apotekama u Banjoj Luci (B07 na Mejdanu, B12 u Dervišima, B22 na Laušu, B39 kod Palate predsjednika), Prijedoru (B Pharm 15), Bijeljini (B Pharm 46 u Emporiumu), Kozarskoj Dubici (B 09), Istočnom Sarajevu (B68 kod Doma zdravlja) možete besplatno uraditi test o procjeni rizika nastanka dijabetesa tipa 2, porazgovarati o simptomima koje ste primijetili iako Vam nije dijagnostikovao dijabetes.

Usluga je preventivnog i savjetodavnog tipa i ne isključuje potrebu za ljekarskim pregledom i detaljnom dijagnostikom ukoliko se ukaže potreba.

# 5 savjeta za zdravo srce



## 1. Prestanite da pušite

Dobra vijest! Kada ostavite cigarete rizik od srčanih oboljenja opada. I bez obzira koliko dugo ili koliko ste pušili, počecete da osjecate dobrobit čim prestanete.



## 2. Vježbajte 30 minuta veći broj dana u sedmici

Redovno vježbanje može da smanji rizik od fatalnih srčanih oboljenja. Fizička aktivnost Vam pomaže da kontrolirate tjelesnu težinu i da smanjite mogućnost nastanka drugih oboljenja koja mogu da naškode Vašem srcu, kao što su visok krvni pritisak, povišen holesterol i dijabetes.



## 3. Hranite se zdravo

Hrana bogata voćem, povrćem, žitaricama cijelog zrna, mahunarkama, mesom sa niskim procentom masti i ribom može da pomogne u zaštiti vašeg srca.



## 4. Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Gojaznost, pogotovo u predjelu stomaka, povećava rizik od srčanih oboljenja. Čak i mali gubitak težine od 5 do 10 % može da pomogne u smanjenju vrijednosti krvnog pritiska, nivoa holesterola u krvi i smanjenju rizika za nastanak dijabetesa.



## 5. Redovno provjeravajte krvni pritisak, nivo holesterola i šećera

Redovna kontrola ovih parametara doprinosi očuvanju Vašeg srca i cjelokupnog zdravlja.

# Midol protect

acetilsalicilna kiselina, 30 gastrozistentnih tableta

- Sprečava nastanak tromba u krvnim sudovima
- Smanjuje rizik od ponovnog srčanog i moždanog udara
- Gastrozistentne tablete obezbjeđuju bolju podnošljivost

**DNEVNO JEDNA,  
SRCU VRIJEDNA!**

Prije prve upotrebe konsultovati ljekara.



Ja   
svoje

Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo o lijeku. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7. APRIL



# SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

**S**vjetski dan zdravlja (engl. World Health Day) obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

## KLJUČNE ČINJENICE:

- Medicinske sestre i babice predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage.

Prva svjetska zdravstvena skupština koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. april je određen za Svjetski dan zdravlja i počeo se slaviti od 1950. godine. Cilj mu je da se skrene pažnja javnosti na prioritete oblasti koje imaju značaj za zdravlje.

- Postoji globalni manjak zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara i babica, koji predstavljaju više od 50% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja jesu medicinske sestre i babice koje igraju vitalnu ulogu u pružanju zdravstvenih usluga. To su ljudi koji svoj život posvećuju brizi za majke i djecu; daju zdravstvene savjete, te brinu o starijim ljudima.

- Najveći nedostatak medicinskih sestara i babica na osnovu potreba je u jugoistočnoj Aziji i Africi.

- Da bi sve zemlje postigle Cilj održivog razvoja 3 o zdravlju i dobrobiti, SZO procjenjuje da će svijetu do 2030. trebati dodatnih 9 miliona medicinskih sestara i babica.

- Medicinske sestre igraju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne njege.

Preuzeto sa site-a Svjetske zdravstvene organizacije



EAU THERMALE  
**Avène**

**AKCIJA STOP AKNE**  
U PERIODU OD 02. DO 15.03.2020.

**-30%**

# POLENSKA ALERGIJA



**ALERGIJE**

**P**olen je jedan od najčešćih okidača sezonskih alergija. Alergija na polen je poznata i pod nazivom polenska groznica, dok doktori uglavnom koriste termin sezonski alergijski rinitis koji može trajati od marta, pa sve do oktobra, kada i prestaje cvjetanje biljaka. Svakog proljeća, ljeta i jeseni, biljke ispuštaju mala zrnca kako bi se oprašile druge biljke iste vrste. Većina polena koji uzrokuje alergijsku reakciju dolazi od drveća, korova i trava. Ova vrsta biljaka proizvodi mala, suva i lagana zrnca koja se kreću vazduhom uz pomoć vjetra. Najčešći uzročnici alergija su trave, a najčešći uzročnik alergija iz vrste korova je ambrozija. Veliki alergeni su i određene vrste drveća kao što su: breza, hrast, grab, čempresi. Biljke koje se oprašuju pomoću insekata (ruže), te drveće voća (višnja, trešnja, kruška), obično ne uzrokuju alergijski rinitis.

Koncentracija polena je podatak o količini polena u zraku. Ova informacija se obično dobije iz meteorološkog zavoda BiH.

Osobe koje imaju alergiju na polen, imaju simptome samo kada se polen na koji su alergični nalazi u zraku. Simptomi uključuju:

- Curenje nosa i povećana proizvodnja sekreta
- Kihanje
- Svrab nosa, očiju, ušiju i nepca
- Zapušen nos
- Crvene i suzne oči
- Otok oko očiju
- Natečenost nosne sluznice

- Nadražajni suvi kašalj
- Otežano disanje
- Urtikarija (crvenilo kože, kontaktni dermatitis)

**Postoje koraci koje možete preduzeti kako biste smanjili alergijsku reakciju na polen:**

1. Ograničite kretanje kada je koncentracija polena visoka. Ovo će smanjiti količinu polenskog alergena koji udahnete, te će smanjiti simptome.
2. Držite zatvorene prozore i ukoliko koristite klima uređaje, obavezno neka budu sa filterom.
3. Počnite uzimati terapiju tj. lijekove protiv simptoma alergije prije početka sezone polena. Lijekovi će spriječiti ispuštanje histamina koji uzrokuje simptome alergija.
4. Obavezno se tuširajte i operite kosu šamponom prije spavanja. Ovo će ukloniti polen iz vaše kose i sa vaše kože, te spriječiti zadržavanje na posteljini.
5. Mijenjajte posteljinu sedmično, uz prethodno pranje na najvišoj temperaturi.
6. Nosite naočare i kape, što će spriječiti prisustvo polena u vašoj kosi, te kontakt s očima.
7. Ograničite blizak kontakt s kućnim ljubimcima koji provode vrijeme vani.
8. Prilikom ulaska u kući, odmah se presvucite
9. Nemojte sušiti veš vani. Najbolja je opcija korišćenje mašine za sušenje veša.



## OPORAVAK I OSVJEŽENJE ZA NAJMLAĐE

NAKON STOMAČNIH TEGOBA I BOLESTI

# ALVOGEN O.R.S.

BRZA I EFIKASNA NADOKNADA  
TEČNOSTI I ELEKTROLITA

ALVOGEN O.R.S. SE MOŽE KUPITI U SVIM APOTEKAMA BEZ LIJEKARSKOG RECEPTA.  
JEDNOSTAVAN JE ZA UPOTREBU, A MOGU GA KORISTITI I NAJMLAĐA DJECA.

[www.alvogenors.ba](http://www.alvogenors.ba)



ZDRAVLJE URINARNOG TRAKTA

## OPET VAS MUČI UPALA BEŠIKE?

**I**ako i muškarci i žene mogu dobiti infekcije urinarnog trakta, žene su sklonije. Skoro svaka žena je imala simptome infekcije urinarnog trakta barem jednom u životu. 25% njih pate od ponovljenih infekcija, što znači da se suočavaju sa ovim neprijatnim problemom nekoliko puta godišnje.

Simptomi infekcije urinarnog trakta su:

- osjećaj pečenja tokom mokrenja,
- potreba za čestim posjetama toaletu,
- poremećaj mirisa urina,
- krv u urinu,
- bol u donjem stomaku,
- temperatura.

Najčešće, upala mokraćne bešike nastaje zbog bakterija koje se probijaju u urinarni trakt i prekomjerno se razmnožavaju. Istraživanja pokazuju da je 75% do 95% slučajeva upale mokraćne bešike uzrokovano bakterijom *Escherichia coli*.

Vodite brigu o svom urinarnom zdravlju na jednostavan i prirodan način sa Urifar napicima. Oni sadrže izuzetnu kombinaciju D-manoze i nara, koji brzo i efikasno ublažavaju simptome i eliminišu upalu bešike! D-manoza sprječava da bakterija *E. coli*, koja je često otporna na antibiotike, bude vezana

za zid mokraćne bešike. Zbog aktivnosti D-manoze, *E. coli* se lako izlučuje zajedno sa sadržajem mokraćne bešike u roku od 30 do 60 minuta nakon konzumiranja. Urifar se preporučuju za sve osobe sa problemima urinarne infekcije:

- u slučaju periodične infekcije urinarnog trakta,
- za prevenciju recidiva infekcija urinarnog trakta,
- kao dodatak liječenju antibioticima,
- za prevenciju postkoitalne infekcije (nakon spolnog odnosa).

14 napitka  
za 7-14 dana, djeluje za 30 minuta



NOVO IZ INFARMA!

# ŠTA JE SERAPEPTAZA?

Serapeptaza pripada širokoj grupi proteolitičkih enzima koji su potrebni za razlaganje proteina, i svoj efekat ostvaruje u gotovo svim sistemima organa u kojima postoje patološki procesi praćeni upalom, otokom, bolom, stvaranjem gnoja, mukusa ili hematoma. FlamIN i FlamIN forte su dodaci ishrani sa serapeptazom.

Djelovanje serapeptaze je višestruko: anti-inflamatorno, antiedematozno, analgetsko i mukolitičko, te su i područja njene primjene različita:

- kod uganuća, iščašenja, preloma, sportskih povreda, i kao dodatak redovnoj terapiji reumatoidnog artritisa i osteoartritisa, uz prethodnu konzultaciju sa doktorom
- nakon hirurških zahvata praćenih otokom na mestu intervencije
- na smanjenje otoka nakon maksilofacijalnih i drugih hirurških intervencija u usnoj duplji
- na razvodnjavanje i olakšano izbacivanje gustog sekreta iz gornjih i donjih disajnih puteva, pa je njeno mjesto uz terapiju akutnog i hroničnog sinuzitisa, rinofaringitisa i bronhitisa
- na fibromatozne promjene i ciste, pa može biti korisna kod fibrocističnih promjena na grudima, i ostalih cističnih struktura na urogenitalnim organima.

Kada govorimo o FlamIN i FlamIN forte serapeptazi, moramo da napomenemo da su u pitanju gastrozistentne kapsule biljnog porekla. Dakle, ove kapsule prolaze kroz želudac u nepromijenjenom obliku – otporne su na djelovanje želučanih enzima, stižu do tankog creva (mjesto apsorpcije) a odatle putem krvi dalje do mjesta gdje treba da djeluju (npr. do upalnog procesa). Razlika između ova dva proizvoda jeste u aktivnosti serapeptaze u jednoj kapsuli: jedna kapsula FlamINa ima 60000 internacionalnih jedinica, dok FlamIN forte ima 120000 IJ.

Primjena je jednostavna i dozvoljena za sve starije od 12 godina: popiti jednu kapsulu FlamIN forte dnevno odnosno 1 do 2 kapsule FlamINa, sa punom čašom vode na prazan stomak.



-10%

TOKOM MARTA,  
U B PHARM APOTEKAMA  
OSTVARITE POPUST OD 10%  
NA MERZ PREPARATE!



## Katalog vrijedi u svim našim apotekama Od 01.03. do 30.04.2020. godine.

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
B Pharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
B Pharm br. 6	BOSANSKI BROAD	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
B Pharm br. 7	BANJA LUKA	Carice Milice 17A	051/460-554	065/976-099
B Pharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
B Pharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujasina br. 9A	052/417-003	066/702-961
B Pharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
B Pharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
B Pharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
B Pharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREZIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
B Pharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58	052/233-223	066/910-882
B Pharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
B Pharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 3	052/665-107	066/702-947
B Pharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
B Pharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
B Pharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
B Pharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
B Pharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
B Pharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
B Pharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
B Pharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
B Pharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
B Pharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
B Pharm br. 42	PELAGIČEVO	Pelagićevo bb	054/815-070	065/011-428
B Pharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
B Pharm br. 45	BIJELJINA	Cara Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
B Pharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1	055/223-722	065/011-615
B Pharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb.	055/292-412	065/011-641
B Pharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
B Pharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325
B Pharm br. 50	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/773-222	065/011-707
B Pharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
B Pharm br. 52	VLASENICA	Srpskih ranjenika br. 11	056/710-865	065/011-729
B Pharm br. 53	BIJELJINA	Srpske Vojske br. 11	055/210-833	065/012-412
B Pharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br. bb	049/213-029	065/012-587
B Pharm br. 55	BRČKO	Bulevar mira br. 5	049/217-200	065/012-577
B Pharm br. 56	BRČKO	Braće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
B Pharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
B Pharm br. 58	BRČKO	Reisa Džemaludina Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
B Pharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
B Pharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-522
B Pharm br. 61	BRKA	Brka bb	049/507-005	065/012-630
B Pharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
B Pharm br. 63	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 3	057/342-909	065/716-865
B Pharm br. 64	ROGATICA	Trg Oslobodilaca br. 7	058/415-955	065/717-051
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Braće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
B Pharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
B Pharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
B Pharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 1	057/490-003	065/165-880
B Pharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065-154-456
B Pharm br. 70	KOZARAC	Maršala Tita br. 4	052/344-557	065-151-349
B Pharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344 007	065-149-186
B Pharm br. 73	BANJA LUKA	Milana Tepića br. 23	051 224 310	065 717 764

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će Vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.  
Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.